ANONA fructu luteſcente, lævi, ſcrotum Arietis referente.

THE Trunks of theſe Trees are ſeldom bigger than the Small of a Man's Leg, and are about ten or twelve Feet high, having a ſmooth greeniſh brown Bark. In *March* when the Leaves begin to ſprout, its Bloſſoms appear, conſiſting each of ſix greeniſh white Petals. The Fruit grows in Cluſters of three, and ſometimes four together; they are at firſt green, and when ripe yellow, covered with a thin ſmooth Skin, which contains a yellow Pulp, of a ſweet luſcious Taſte; in the Middle of which lye in two Rows, twelve Seeds divided by ſo many thin Membranes. All Parts of the Tree have a rank, if not a fœtid Smell; nor is the Fruit reliſhed but by very few, except *Negro's*. Theſe Trees grow uſually in low ſhady Swamps, and in a very fat Soil.

LE Tronc de ces arbres n'eſt ordinairement que de la groſſeur du bas de la Jambe, ils ont environ dix ou douze pieds de haut, l'écorce eſt unie & d'un brun verdâtre. Les feuilles commencent, à venir au mois de Mars, les fleurs paroiſſent alors & conſiſtent chacune de ſix petals d'un blanc verdâtre. Le fruit croît en grape de trois & quelques fois de quatre, il eſt verd au commencement, & jaune quand il eſt meur, couvert d'une peau unie & mince qui renferme une poulpe jaune d'un goût doux & fade, & au milieu on y trouve douze ſemences en deux rangs, chaque pepin eſt ſeparé par une petite membrane mince. Toutes les parties de cet arbre ont une odeur forte, ou pour mieux dire puante; il n'y a preſque perſonne qui mange de ce fruit, excepte les Negres. Ces arbres croiſſent ordinairement dans des endroits bas & ombrageux, & ſur une bonne terre graſſe.

MARK CATESBY *The Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands* LONDON, 1731–1747 CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES Octavo